LKH Univ. Klinikum Graz
Klin. Abteilung für Rheumatologie und Immunologie / Immunologisches Labor

Synovia Anforderung

Immunologisches Labor Tel.: 12649

qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR.26000/0

Name des Patienten	
Zuweiser + Arzt	
Zuweisungsdiagnose	
Abnahmedatum	
Eingangsdatum	
Punktionslokalität	

Nur bei längerer Lagerung (> 24 Stunden z.B. Wochenende oder Feiertag). Eine differenzielle Zellanalyse nach Verdünnung mit Heparin ist nicht möglich. Die vorgeschriebene Heparinmenge UF-Heparin 5000I.E. (1 Teil Heparinlösung 4 Teile Gelenkspunktat) muss unbedingt eingehalten werden, da es sonst zur Aktivierung der im Probenmaterial enthaltenden Gerinnungsfaktoren kommt. (siehe Tabelle)

Heparin	Gelenkspunktat
1 ml	4 ml
0,8 ml	3,2 ml
0,5 ml	2 ml
0,4 ml	1,6 ml

Verdünnung mit Heparin

5000 I.E. ja ☐ nein ☐

Verdünnungsverhältnis

_____

Beurteilung makroskopisch (Labor)

Beurteilung mikroskopisch (Labor)

Zellzahl/µl: _____ **Granulozyten:** _____ **Lymphozyten:** _____ **Monozyten:** _____

Beurteilung mikroskopisch (Labor)

Befundung