LKH Univ. Klinikum Graz
Klin. Abteilung für Rheumatologie und Immunologie /Immunologisches Labor

qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR.26000/0

Synovia Anforderung
Immunologisches Labor Tel.: 12649

Name des Patienten	
Zuweiser + Arzt	
Zuweisungsdiagnose	
Abnahmedatum	
Eingangsdatum	
Punktionslokalität	

Nur bei längerer Lagerung (> 24 Stunden z.B. Wochenende oder Feiertag). Eine differenzielle Zellanalyse nach Verdünnung mit Heparin ist nicht möglich. Die vorgeschriebene Heparinmenge UF-Heparin 5000I.E. (1 Teil Heparinlösung + 4 Teile Gelenkspunktat) muss unbedingt eingehalten werden. (siehe Tabelle)

Heparin	Gelenkspunktat
1 ml	4 ml
0,8 ml	3,2 ml
0,5 ml	2 ml
0,4 ml	1,6 ml

Verdünnung mit Heparin

5000 I.E. ja ☐ nein ☐

Verdünnungsverhältnis

_____

Beurteilung makroskopisch (Labor)

Beurteilung mikroskopisch (Labor)

Zellzahl/µl: _____ Granulozyten: _____ Lymphozyten: _____ Monozyten: _____

Beurteilung mikroskopisch (Labor)

Befundung